

# Η θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης :

## Ορισμοί – Ιδιότητες - Προτάσεις – Θεωρήματα – Αποδείξεις

### Γ<sub>1</sub>. Διαφορικός λογισμός (Κανόνες παραγώγισης)

**1.** Πότε μια συνάρτηση  $f$  λέγεται παραγωγίσιμη στο σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της ;

#### Απάντηση

Μια συνάρτηση  $f$  λέμε ότι είναι **παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο  $x_0$**  του πεδίου ορισμού της, αν υπάρχει το

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

και είναι πραγματικός αριθμός.

Το όριο αυτό ονομάζεται **παράγωγος της  $f$  στο  $x_0$**  και συμβολίζεται με  $f'(x_0)$ . Δηλαδή:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

#### Σχόλια

**α)** Αν, τώρα, στην ισότητα  $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  θέσουμε  $x = x_0 + h$ , τότε έχουμε

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

**β)** Αν το  $x_0$  είναι εσωτερικό σημείο ενός διαστήματος του πεδίου ορισμού της  $f$ , τότε:

Η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$ , αν και μόνο αν υπάρχουν στο  $\mathbb{R}$  τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

και είναι ίσα.

**2.** Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της  $C_f$  στο σημείο της  $A(x_0, f(x_0))$ .

#### Απάντηση

• Η εξίσωση της **εφαπτομένης (ε)** της  $C_f$  στο σημείο της  $A(x_0, f(x_0))$  είναι:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

#### Σχόλιο



$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow \beta^-} \frac{f(x) - f(\beta)}{x - \beta} \in \mathbb{R}.$$

**5.** Να αποδείξετε ότι :

**α)** Αν  $f(x) = c$ , τότε  $f'(x) = 0$

**β)** Αν  $f(x) = x$ , τότε  $f'(x) = 1$

**γ)** Αν  $f(x) = x^v$ , με  $v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$ , τότε  $f'(x) = vx^{v-1}$

**δ)** Αν  $f(x) = \sqrt{x}$ , τότε  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ,  $x > 0$

### Απόδειξη

**α)** Για  $x \neq x_0$  ισχύει:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{c - c}{x - x_0} = 0.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0,$$

δηλαδή  $(c)' = 0$ .

**β)** Για  $x \neq x_0$  ισχύει ότι :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 1 = 1,$$

δηλαδή  $(x)' = 1$ .

**γ)** Αν  $x_0$  είναι ένα σημείο του  $\mathbb{O}$ , τότε για  $x \neq x_0$  ισχύει:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^v - x_0^v}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x_0^{v-1})}{x - x_0} = x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x_0^{v-1},$$

Επομένως :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x_0^{v-1}) = x_0^{v-1} + x_0^{v-1} + \dots + x_0^{v-1} = vx_0^{v-1},$$

δηλαδή  $(x^v)' = vx^{v-1}$ . ■

**δ)** Αν  $x_0$  είναι ένα σημείο του  $(0, +\infty)$ , τότε για  $x \neq x_0$  ισχύει:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x_0})(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \frac{x - x_0}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}},$$

οπότε :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}},$$

δηλαδή  $\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$

### Σχόλια – Τύποι

- Έστω συνάρτηση  $f(x) = \eta\mu x$ . Η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  και ισχύει

$$f'(x) = \sigma\upsilon\nu x, \text{ δηλαδή}$$

$$(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$$

- Έστω η συνάρτηση  $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ . Η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  και ισχύει

$$f'(x) = -\eta\mu x, \text{ δηλαδή}$$

$$(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$$

- Έστω η συνάρτηση  $f(x) = e^x$ . Αποδεικνύεται ότι η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  και ισχύει

$$f'(x) = e^x, \text{ δηλαδή}$$

$$(e^x)' = e^x$$

- Έστω η συνάρτηση  $f(x) = \ln x$ . Αποδεικνύεται ότι η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $(0, +\infty)$  και

$$\text{ισχύει } f'(x) = \frac{1}{x}, \text{ δηλαδή}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

### 6. Θεώρημα

Αν οι συναρτήσεις  $f, g$  είναι παραγωγίσιμες στο  $x_0$ , τότε η συνάρτηση  $f + g$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$  και ισχύει:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

### Απόδειξη

Για  $x \neq x_0$ , ισχύει:

$$\frac{(f+g)(x)-(f+g)(x_0)}{x-x_0} = \frac{f(x)+g(x)-f(x_0)-g(x_0)}{x-x_0} = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} + \frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}.$$

Επειδή οι συναρτήσεις  $f, g$  είναι παραγωγίσιμες στο  $x_0$ , έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f+g)(x)-(f+g)(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0) + g'(x_0),$$

δηλαδή  $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$ .

### Σχόλια – Τύποι

**A.** Αν οι συναρτήσεις  $f, g$  είναι παραγωγίσιμες στο  $x_0$ , τότε και η συνάρτηση  $f \cdot g$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$  και ισχύει:

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

Ισχύει επομένως ότι :

- Αν οι συναρτήσεις  $f, g$  είναι παραγωγίσιμες σ' ένα διάστημα  $\Delta$ , τότε για κάθε  $x \in \Delta$  ισχύει:

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

- Αν  $f$  είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση σ' ένα διάστημα  $\Delta$  και  $c \in \mathbb{R}$ , επειδή  $(c)' = 0$ , σύμφωνα με το θεώρημα (2) έχουμε:

$$(cf(x))' = cf'(x)$$

**B.** Αν οι συναρτήσεις  $f, g$  είναι παραγωγίσιμες στο  $x_0$  και  $g(x_0) \neq 0$ , τότε και η συνάρτηση  $\frac{f}{g}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$  και ισχύει:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}$$

Ισχύει επομένως ότι :

Αν οι συναρτήσεις  $f, g$  είναι παραγωγίσιμες σ' ένα διάστημα  $\Delta$  και για κάθε  $x \in \Delta$  ισχύει  $g(x) \neq 0$ , τότε για κάθε  $x \in \Delta$  έχουμε:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

**Γ.** Έστω η συνάρτηση  $f(x) = x^{-v}$ ,  $v \in \mathbb{N}^*$ . Η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}^*$  και ισχύει  $f'(x) = -vx^{-v-1}$ , δηλαδή

$$(x^{-v})' = -vx^{-v-1}$$

### Απόδειξη

Πράγματι, για κάθε  $x \in \mathbb{R}^*$  έχουμε:

$$(x^{-v})' = \left( \frac{1}{x^v} \right)' = \frac{(1)'x^v - 1(x^v)'}{(x^v)^2} = \frac{-vx^{v-1}}{x^{2v}} = -vx^{-v-1}.$$

**Δ.** • Έστω η συνάρτηση  $f(x) = \varepsilon\phi x$ . Η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R} - \{x | \sigma\upsilon\nu x = 0\}$  και ισχύει  $f'(x) = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$ , δηλαδή

$$(\varepsilon\phi x)' = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$$

### Απόδειξη

Πράγματι, για κάθε  $x \in \mathbb{R} - \{x | \sigma\upsilon\nu x = 0\}$  έχουμε:

$$\begin{aligned} (\varepsilon\phi x)' &= \left( \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} \right)' = \frac{(\eta\mu x)' \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x (\sigma\upsilon\nu x)'}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{\sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x \eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} \\ &= \frac{\sigma\upsilon\nu^2 x + \eta\mu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

• Έστω η συνάρτηση  $f(x) = \sigma\phi x$ . Η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R} - \{x | \eta\mu x = 0\}$  και ισχύει  $f'(x) = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}$ , δηλαδή

$$(\sigma\phi x)' = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}$$

### 7. Θεώρημα

Αν η συνάρτηση  $g$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$  και η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $g(x_0)$ , τότε η συνάρτηση  $f \circ g$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$  και ισχύει

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

### Σχόλια

Γενικά, αν μια συνάρτηση  $g$  είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα  $\Delta$  και η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $g(\Delta)$ , τότε η συνάρτηση  $f \circ g$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\Delta$  και ισχύει

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Δηλαδή, αν  $u = g(x)$ , τότε

$$(f(u))' = f'(u) \cdot u'.$$

Με το συμβολισμό του Leibniz, αν  $y = f(u)$  και  $u = g(x)$ , έχουμε τον τύπο

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

που είναι γνωστός ως **κανόνας της αλυσίδας**.

## 8. Θεώρημα

Να αποδείξετε ότι :

α) Η συνάρτηση  $f(x) = x^\alpha$ ,  $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $(0, +\infty)$  και ισχύει

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1},$$

β) Η συνάρτηση  $f(x) = \alpha^x$ ,  $\alpha > 0$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  και ισχύει  $f'(x) = \alpha^x \ln \alpha$ .

γ) Η συνάρτηση  $f(x) = \ln |x|$ ,  $x \in \mathbb{R}^*$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x \in \mathbb{R}^*$  και ισχύει

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$$

## Απόδειξη

α) Πράγματι, αν  $y = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$  και θέσουμε  $u = \alpha \ln x$ , τότε έχουμε  $y = e^u$ . Επομένως,

$$y' = (e^u)' = e^u \cdot u' = e^{\alpha \ln x} \cdot \alpha \cdot \frac{1}{x} = x^\alpha \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

β) Πράγματι, αν  $y = \alpha^x = e^{x \ln \alpha}$  και θέσουμε  $u = x \ln \alpha$ , τότε έχουμε  $y = e^u$ . Επομένως,

$$y' = (e^u)' = e^u \cdot u' = e^{x \ln \alpha} \cdot \ln \alpha = \alpha^x \ln \alpha.$$

γ) Πράγματι

— αν  $x > 0$ , τότε  $(\ln |x|)' = (\ln x)' = \frac{1}{x}$ , ενώ

— αν  $x < 0$ , τότε  $\ln |x| = \ln(-x)$ , οπότε, αν θέσουμε  $y = \ln(-x)$  και  $u = -x$ , έχουμε  $y = \ln u$ . Επομένως,

$$y' = (\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u' = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}$$

και άρα  $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$ .

## Σχόλιο

Τις παραπάνω αποδείξεις μπορούμε να τις απλοποιήσουμε. Αυτό να γίνει στην τάξη από τον καθηγητή.

## Γ<sub>2</sub>. Διαφορικός λογισμός

(Βασικά θεωρήματα-Συνέπειες ΘΜΤ - Μονοτονία)

**9.** Τι λέμε ρυθμό μεταβολής του μεγέθους  $y$  ως προς το μέγεθος  $x$  για  $x = x_0$ , αν  $y = f(x)$  είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση ;

## Απάντηση

Αν δύο μεταβλητά μεγέθη  $x, y$  συνδέονται με τη σχέση  $y = f(x)$ , όταν  $f$  είναι μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο  $x_0$ , τότε ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής του  $y$  ως προς το  $x$  στο σημείο  $x_0$  την παράγωγο  $f'(x_0)$ .

**10.** Να διατυπώσετε τι θεώρημα του Rolle και να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία.

## Απάντηση


Το θεώρημα του Rolle διατυπώνεται ως εξής :

Αν μια συνάρτηση  $f$  είναι:

- συνεχής στο κλειστό διάστημα  $[a, \beta]$
- παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα  $(a, \beta)$  και
- $f(a) = f(\beta)$

τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον,  $\xi \in (a, \beta)$  τέτοιο, ώστε  $f'(\xi) = 0$

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα, τουλάχιστον,  $\xi \in (a, \beta)$  τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της  $C_f$  στο  $M(\xi, f(\xi))$  να είναι παράλληλη στον άξονα των  $x$ .



**11.** Να διατυπώσετε το θεώρημα της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία.

## Απάντηση

Το θεώρημα της μέσης τιμής διατυπώνεται ως εξής :


Αν μια συνάρτηση  $f$  είναι:

- συνεχής στο κλειστό διάστημα  $[a, \beta]$  και
- παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα  $(a, \beta)$

τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον,  $\xi \in (a, \beta)$  τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$$

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα, τουλάχιστον,  $\xi \in (a, \beta)$  τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της  $f$  στο σημείο  $M(\xi, f(\xi))$  να είναι παράλληλη της ευθείας  $AB$ .





## 12. Θεώρημα

Έστω μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα διάστημα  $\Delta$ . Αν

- η  $f$  είναι συνεχής στο  $\Delta$  και
- $f'(x) = 0$  για κάθε εσωτερικό σημείο  $x$  του  $\Delta$ ,

τότε η  $f$  είναι σταθερή σε όλο το διάστημα  $\Delta$ .

### Απάντηση

Αρκεί να αποδείξουμε ότι για οποιαδήποτε  $x_1, x_2 \in \Delta$  ισχύει  $f(x_1) = f(x_2)$ . Πράγματι

- Αν  $x_1 = x_2$ , τότε προφανώς  $f(x_1) = f(x_2)$ .
- Αν  $x_1 < x_2$ , τότε στο διάστημα  $[x_1, x_2]$  η  $f$  ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος μέσης τιμής. Επομένως, υπάρχει  $\xi \in (x_1, x_2)$  τέτοιο, ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. \quad (1)$$

Επειδή το  $\xi$  είναι εσωτερικό σημείο του  $\Delta$ , ισχύει  $f'(\xi) = 0$ , οπότε, λόγω της (1), είναι  $f(x_1) = f(x_2)$ . Αν  $x_2 < x_1$ , τότε ομοίως αποδεικνύεται ότι  $f(x_1) = f(x_2)$ . Σε όλες, λοιπόν, τις περιπτώσεις είναι  $f(x_1) = f(x_2)$ . ■

## 13. Θεώρημα

Έστω δυο συναρτήσεις  $f, g$  ορισμένες σε ένα διάστημα  $\Delta$ . Αν

- οι  $f, g$  είναι συνεχείς στο  $\Delta$  και
- $f'(x) = g'(x)$  για κάθε εσωτερικό σημείο  $x$  του  $\Delta$ ,

τότε υπάρχει σταθερά  $c$  τέτοια, ώστε για κάθε  $x \in \Delta$  να ισχύει:


$$f(x) = g(x) + c$$

### Απάντηση

Η συνάρτηση  $f - g$  είναι συνεχής στο  $\Delta$  και για κάθε εσωτερικό σημείο  $x \in \Delta$  ισχύει

$$(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x) = 0.$$

Επομένως, σύμφωνα με το παραπάνω θεώρημα, η συνάρτηση  $f - g$  είναι σταθερή στο  $\Delta$ . Άρα, υπάρχει σταθερά  $C$  τέτοια, ώστε για κάθε  $x \in \Delta$  να ισχύει  $f(x) - g(x) = c$ , οπότε  $f(x) = g(x) + c$ . ■



### Σχόλιο

Τα παραπάνω θεωρήματα (3 και 4) ισχύουν σε διάστημα και όχι σε ένωση διαστημάτων.

## 14. Πρόταση (χωρίς απόδειξη)

Αν για μια συνάρτηση  $f$  ισχύει ότι

$$f'(x) = f(x) \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

τότε  $f(x) = ce^x$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ . Αντί του  $\mathbb{R}$  μπορούμε να έχουμε τυχαίο διάστημα  $\Delta$ .

### 15. Θεώρημα

Έστω μια συνάρτηση  $f$ , η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα  $\Delta$ .

- Αν  $f'(x) > 0$  σε κάθε εσωτερικό σημείο  $x$  του  $\Delta$ , τότε η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το  $\Delta$ .
- Αν  $f'(x) < 0$  σε κάθε εσωτερικό σημείο  $x$  του  $\Delta$ , τότε η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το  $\Delta$ .

### Απάντηση

- Αποδεικνύουμε το θεώρημα στην περίπτωση που είναι  $f'(x) > 0$ .

Έστω  $x_1, x_2 \in \Delta$  με  $x_1 < x_2$ . Θα δείξουμε ότι  $f(x_1) < f(x_2)$ . Πράγματι, στο διάστημα  $[x_1, x_2]$  η  $f$  ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. Επομένως, υπάρχει  $\xi \in (x_1, x_2)$  τέτοιο, ώστε  $f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ , οπότε έχουμε

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

Επειδή  $f'(\xi) > 0$  και  $x_2 - x_1 > 0$ , έχουμε  $f(x_2) - f(x_1) > 0$ , οπότε  $f(x_1) < f(x_2)$ .

- Στην περίπτωση που είναι  $f'(x) < 0$  εργαζόμαστε αναλόγως. ■

### Σχόλιο

Το αντίστροφο του παραπάνω θεωρήματος **δεν ισχύει**. Δηλαδή, αν η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα (αντιστοίχως γνησίως φθίνουσα) στο  $\Delta$ , η παράγωγός της **δεν είναι υποχρεωτικά** θετική (αντιστοίχως αρνητική) στο εσωτερικό του  $\Delta$ .

## Γ<sub>3</sub>. Διαφορικός λογισμός (ακρότατα- σημεία καμπής – ασύμπτωτες- κανόνες de L'Hospital)

**16.** Πότε μια συνάρτηση  $f$  με πεδίο ορισμού  $A$  παρουσιάζει στο  $x_0 \in A$  τοπικό μέγιστο και πότε τοπικό ελάχιστο ;

### Απάντηση

- α) Μια συνάρτηση  $f$ , με πεδίο ορισμού  $A$ , θα λέμε ότι παρουσιάζει στο  $x_0 \in A$  **τοπικό μέγιστο**, όταν υπάρχει  $\delta > 0$ , τέτοιο ώστε :

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ για κάθε } x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

Το  $x_0$  λέγεται **θέση ή σημείο τοπικού μεγίστου**, ενώ το  $f(x_0)$  **τοπικό μέγιστο της  $f$** .

β) Μία συνάρτηση  $f$ , με πεδίο ορισμού  $A$ , θα λέμε ότι παρουσιάζει στο  $x_0 \in A$  **τοπικό ελάχιστο**, όταν υπάρχει  $\delta > 0$ , τέτοιο ώστε :

$$f(x) \geq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

Το  $x_0$  λέγεται **θέση ή σημείο τοπικού ελαχίστου**, ενώ το  $f(x_0)$  **τοπικό ελάχιστο της  $f$** .

### Σχόλιο

Αν μια συνάρτηση  $f$  παρουσιάζει μέγιστο, τότε αυτό θα είναι το μεγαλύτερο από τα τοπικά μέγιστα, ενώ αν παρουσιάζει, ελάχιστο, τότε αυτό θα είναι το μικρότερο από τα τοπικά ελάχιστα. Το μεγαλύτερο όμως από τα τοπικά μέγιστα μίας συνάρτησης δεν είναι πάντοτε μέγιστο αυτής. Επίσης το μικρότερο από τα τοπικά ελάχιστα μίας συνάρτησης δεν είναι πάντοτε ελάχιστο της συνάρτησης.

### Θεώρημα Fermat

**17.** Έστω μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σ' ένα διάστημα  $\Delta$  και  $x_0$  ένα **εσωτερικό** σημείο του  $\Delta$ . Αν η  $f$  παρουσιάζει **τοπικό ακρότατο** στο  $x_0$  και είναι **παραγωγίσιμη** στο σημείο αυτό, να αποδείξετε ότι :  $f'(x_0) = 0$

### Απόδειξη

Ας υποθέσουμε ότι η  $f$  παρουσιάζει στο  $x_0$  τοπικό μέγιστο. Επειδή το  $x_0$  είναι εσωτερικό σημείο του  $\Delta$  και η  $f$  παρουσιάζει σ' αυτό τοπικό μέγιστο, υπάρχει  $\delta > 0$  τέτοιο, ώστε

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq \Delta \quad \text{και}$$

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta). \quad (1)$$

Επειδή, επιπλέον, η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$ , ισχύει

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Επομένως,

— αν  $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ , τότε, λόγω της (1), θα είναι  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ , οπότε θα έχουμε


$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad (2)$$

— αν  $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ , τότε, λόγω της (1), θα είναι  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ , οπότε θα έχουμε

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0. \quad (3)$$

Έτσι, από τις (2) και (3) έχουμε  $f'(x_0) = 0$ .

Η απόδειξη για τοπικό ελάχιστο είναι ανάλογη. ■



**18. α)** Ποια λέγονται κρίσιμα σημεία μιας συνάρτησης  $f$  σε ένα διάστημα  $\Delta$  ;

**β)** Ποιες είναι οι πιθανές θέσεις ακροτάτων μιας συνάρτησης  $f$  σε ένα διάστημα  $\Delta$  ;

**Απάντηση**

α) **Κρίσιμα σημεία** της  $f$  στο διάστημα  $\Delta$  λέγονται τα *εσωτερικά* σημεία του  $\Delta$ , στα οποία η  $f$  δεν παραγωγίζεται ή η παράγωγός της είναι ίση με το μηδέν.

β) Οι *πιθανές θέσεις των τοπικών ακρότατων* μιας συνάρτησης  $f$  σ' ένα διάστημα  $\Delta$  είναι:

1. Τα εσωτερικά σημεία του  $\Delta$  στα οποία η παράγωγος της  $f$  μηδενίζεται.
2. Τα εσωτερικά σημεία του  $\Delta$  στα οποία η  $f$  δεν παραγωγίζεται.
3. Τα άκρα του  $\Delta$  (αν ανήκουν στο πεδίο ορισμού της).

**19.** Πώς βρίσκουμε τα ολικά ακρότατα σε μια συνεχή συνάρτηση  $f$  σε ένα κλειστό διάστημα ;

**Απάντηση**

Για την εύρεση του μέγιστου και ελάχιστου της συνάρτησης  $f$  σε ένα κλειστό διάστημα εργαζόμαστε ως εξής:

1. Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία της  $f$ .
2. Υπολογίζουμε τις τιμές της  $f$  στα σημεία αυτά και στα άκρα των διαστημάτων.
3. Από αυτές τις τιμές η μεγαλύτερη είναι το μέγιστο και η μικρότερη το ελάχιστο της  $f$ .

**20. Θεώρημα**

Έστω μια συνάρτηση  $f$  παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα  $(\alpha, \beta)$ , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του  $x_0$ , στο οποίο όμως η  $f$  είναι **συνεχής**.

- i) Αν  $f'(x) > 0$  στο  $(\alpha, x_0)$  και  $f'(x) < 0$  στο  $(x_0, \beta)$ , τότε το  $f(x_0)$  είναι τοπικό μέγιστο της  $f$ .
- ii) Αν η  $f'(x)$  διατηρεί πρόσημο στο  $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$ , τότε το  $f(x_0)$  δεν είναι τοπικό ακρότατο και η  $f$  είναι γνησίως μονότονη στο  $(\alpha, \beta)$ .



**Απόδειξη**

i) Επειδή  $f'(x) > 0$  για κάθε  $x \in (\alpha, x_0)$  και η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0$ , η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $(\alpha, x_0]$ . Έτσι έχουμε

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in (\alpha, x_0]. \quad (1)$$

Επειδή  $f'(x) < 0$  για κάθε  $x \in (x_0, \beta)$  και η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0$ , η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $[x_0, \beta)$ . Έτσι έχουμε:

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in [x_0, \beta). \quad (2)$$





Επομένως, λόγω των (1) και (2), ισχύει:

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in (a, \beta),$$

που σημαίνει ότι το  $f(x_0)$  είναι μέγιστο της  $f$  στο  $(a, \beta)$  και άρα τοπικό μέγιστο αυτής.

ii) Έστω ότι

$$f'(x) > 0, \text{ για κάθε } x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta).$$



Επειδή η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0$  θα είναι γνησίως αύξουσα σε κάθε ένα από τα διαστήματα  $(a, x_0]$  και  $[x_0, \beta)$ . Επομένως, για  $x_1 < x_0 < x_2$  ισχύει  $f(x_1) < f(x_0) < f(x_2)$ . Άρα το  $f(x_0)$  δεν είναι τοπικό ακρότατο της  $f$ . Θα δείξουμε, τώρα, ότι η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $(a, \beta)$ . Πράγματι, έστω  $x_1, x_2 \in (a, \beta)$  με  $x_1 < x_2$ .

— Αν  $x_1, x_2 \in (a, x_0]$ , επειδή η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $(a, x_0]$ , θα ισχύει  $f(x_1) < f(x_2)$ .

— Αν  $x_1, x_2 \in [x_0, \beta)$ , επειδή η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $[x_0, \beta)$ , θα ισχύει  $f(x_1) < f(x_2)$ .

— Τέλος, αν  $x_1 < x_0 < x_2$ , τότε όπως είδαμε  $f(x_1) < f(x_0) < f(x_2)$ .

Επομένως, σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει  $f(x_1) < f(x_2)$ , οπότε η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $(a, \beta)$ .

Ομοίως, αν  $f'(x) < 0$  για κάθε  $x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$ . ■

**21.** Πότε μια συνάρτηση  $f$  λέγεται κυρτή και πότε κοίλη σε ένα διάστημα  $\Delta$  ;

### Απάντηση

- Η συνάρτηση  $f$  λέγεται **κυρτή** ή **ότι στρέφει τα κοίλα άνω** σ' ένα διάστημα  $\Delta$  όταν είναι συνεχής στο  $\Delta$  και η  $f'$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $\varepsilon \sigma \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \acute{o}$  του  $\Delta$ .
- Η συνάρτηση  $f$  λέγεται **κοίλη** ή **ότι στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω** στο  $\Delta$ , αν είναι συνεχής στο  $\Delta$  και η  $f'$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $\varepsilon \sigma \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \acute{o}$  του  $\Delta$ .

**22.** Να διατυπώσετε το θεώρημα που αφορά τα κοίλα και το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου της  $f$ .

### Απάντηση

Ισχύει το παρακάτω θεώρημα :

Έστω μια συνάρτηση  $f$  συνεχής σ' ένα διάστημα  $\Delta$  και δυο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του  $\Delta$ .

- Αν  $f''(x) > 0$  για κάθε εσωτερικό σημείο  $x$  του  $\Delta$ , τότε η  $f$  είναι κυρτή στο  $\Delta$ .
- Αν  $f''(x) < 0$  για κάθε εσωτερικό σημείο  $x$  του  $\Delta$ , τότε η  $f$  είναι κοίλη στο  $\Delta$ .

**23.** Πότε το σημείο  $A(x_0, f(x_0))$  λέγεται σημείο καμπής μιας συνάρτησης  $f$ ;

### Απάντηση

Το σημείο  $A(x_0, f(x_0))$  ονομάζεται **σημείο καμπής** της γραφικής παράστασης της  $f$ , όταν :

- η  $f$  είναι κυρτή στο  $(\alpha, x_0)$  και κοίλη στο  $(x_0, \beta)$ , ή αντιστρόφως, και
- η  $C_f$  έχει εφαπτομένη στο σημείο  $A(x_0, f(x_0))$ .

### Σχόλιο

Όταν το  $A(x_0, f(x_0))$  είναι σημείο καμπής της  $C_f$ , τότε λέμε ότι η  $f$  **παρουσιάζει στο  $x_0$  καμπή** και το  $x_0$  λέγεται **θέση σημείου καμπής**.

**24.** Ποιο θεώρημα αφορά τα σημεία καμπής μιας δυο φορές παραγωγίσιμης συνάρτησης  $f$  ;

### Απάντηση

Για τα σημεία καμπής ισχύει το επόμενο θεώρημα :

Αν το  $A(x_0, f(x_0))$  είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της  $f$  και η  $f$  είναι δυο φορές παραγωγίσιμη, τότε  $f''(x_0) = 0$

### Ερώτηση :

Ποιες είναι οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας συνάρτησης  $f$  σε ένα διάστημα ;

### Απάντηση

Οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας συνάρτησης  $f$  σ' ένα διάστημα  $\Delta$  είναι:

- Τα εσωτερικά σημεία του  $\Delta$  στα οποία η  $f''$  μηδενίζεται .
- Τα εσωτερικά σημεία του  $\Delta$  στα οποία δεν υπάρχει η  $f''$  .

### Μέθοδος –Κριτήριο :

Έστω μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σ' ένα διάστημα  $(\alpha, \beta)$  και  $x_0 \in (\alpha, \beta)$ . Αν

- η  $f''$  αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του  $x_0$  και
  - ορίζεται εφαπτομένη της  $C_f$  στο  $A(x_0, f(x_0))$ ,
- τότε το  $A(x_0, f(x_0))$  είναι σημείο καμπής της  $C_f$ .

**25.** Πότε λέμε ότι η ευθεία  $x = x_0$  είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της  $C_f$ ;

### Απάντηση

Η ευθεία  $x = x_0$  λέγεται **κατακόρυφη ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της  $f$ , αν ένα τουλάχιστον από τα όρια  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  είναι  $+\infty$  ή  $-\infty$ .

**26.** Πότε λέμε ότι η ευθεία  $y = \ell$  λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της  $f$  στο  $+\infty$  (αντιστοίχως στο  $-\infty$ ).

### Απάντηση

Η ευθεία  $y = \ell$  λέγεται **οριζόντια ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της  $f$  στο  $+\infty$  (αντιστοίχως στο  $-\infty$ ), όταν  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$  (αντιστοίχως  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ ).

**27.** Πότε η ευθεία  $y = \lambda x + \beta$  λέγεται **ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της  $f$  στο  $+\infty$ , αντιστοίχως στο  $-\infty$ ;

Η ευθεία  $y = \lambda x + \beta$  λέγεται **ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της  $f$  στο  $+\infty$ , αντιστοίχως στο  $-\infty$ , αν  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$ , αντιστοίχως αν  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$ .

**28.** Με ποιες σχέσεις(τύπους) βρίσκουμε τις ασύμπτωτες της μορφής  $y = \lambda x + \beta$ ;

### Απάντηση

Ισχύει το παρακάτω θεώρημα :

Η ευθεία  $y = \lambda x + \beta$  είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της  $f$  στο  $+\infty$ , αντιστοίχως στο  $-\infty$ , αν και μόνο αν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \lambda x] = \beta \in \mathbb{R},$$

αντιστοίχως :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \lambda x] = \beta \in \mathbb{R}.$$

### Χρήσιμα σχόλια

1. Αποδεικνύεται ότι:

- Οι πολυωνυμικές συναρτήσεις βαθμού μεγαλύτερου ή ίσου του 2 δεν έχουν ασύμπτωτες.
- Οι ρητές συναρτήσεις  $\frac{P(x)}{Q(x)}$ , με βαθμό του αριθμητή  $P(x)$  μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά δύο του βαθμού του παρονομαστή, δεν έχουν πλάγιες ασύμπτωτες.

2. Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης  $f$  αναζητούμε:

- Στα άκρα των διαστημάτων του πεδίου ορισμού της στα οποία η  $f$  δεν ορίζεται.
- Στα σημεία του πεδίου ορισμού της, στα οποία η  $f$  δεν είναι συνεχής.
- Στο  $+\infty$ ,  $-\infty$ , εφόσον η συνάρτηση είναι ορισμένη σε διάστημα της μορφής  $(a, +\infty)$ , αντιστοίχως  $(-\infty, a)$ .

**29.** Να διατυπώσετε τους κανόνες de L'Hospital .

### Απάντηση

#### 1ος Κανόνας

Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ ,  $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$  και υπάρχει το  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  (πεπερασμένο ή άπειρο), τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

#### 2ος Κανόνας

Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ ,  $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$  και υπάρχει το  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  (πεπερασμένο ή άπειρο), τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

### Σχόλιο :

- α) Οι παραπάνω τύποι απαιτούν προσοχή κατά την εφαρμογή τους. Να συζητηθούν στην τάξη οι λεπτομέρειες.
- β) Οι άλλες απροσδιόριστες μορφές να συζητηθούν στην τάξη με τον καθηγητή σας.