

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

$$A. \begin{cases} 3(a-b)+2b=3a+4 \\ 2(3-a)+4(a-b)=7(-b-1)+12 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 6a-3b+2b=3a+4 \\ 6a-2a+4a-4b=-7b-7+12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=3a-4 \\ 2a+3b=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \end{cases}$$

B. α. $P(x) = x^3 + 2x^2 + 5x - 6$ α. $\alpha = 1$ και $b = -1$

$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 + 5x - 6 \\ -x^3 + x^2 \\ \hline 3x^2 + 5x - 6 \\ -3x^2 + 3x \\ \hline 8x - 6 \\ -8x + 8 \\ \hline 2 \end{array}$	$\begin{array}{l} x - 1 \\ x^2 + 3x + 8 \end{array}$
--	--

η ταυτότητα διαίρεσης είναι $\Delta(x) = \delta(x) \cdot \delta(\pi) + \delta(\omega)$ και εδώ έχουμε:
 $x^3 + 2x^2 + 5x - 6 = (x-1)(x^2 + 3x + 8) + 2$

β.

γ. $P(x) = 2 \Leftrightarrow x^3 + 2x^2 + 5x - 6 = 2 \Leftrightarrow (x-1)(x^2 + 3x + 8) + 2 = 2 \Leftrightarrow$
 $(x-1)(x^2 + 3x + 8) = 0$ άρα $x=1$, επειδή το $x^2 + 3x + 8$ έχει
 αρνητική διακρίνουσα.

$$5. P(x) > x^2(x+2) + \frac{13x-6}{2}$$

$$x^3 + 2x^2 + 5x - 6 > x^2(x+2) + \frac{13x-6}{2}$$

$$\cancel{2}x^3 + \cancel{4}x^2 + 10x - 12 > \cancel{2}x^3 + \cancel{4}x^2 + 13x - 6$$

$$-6 > 3x$$

$$-2 > x$$

ΑΣΚΗΣΗ 2

$$a. A(x) = 2x^2 + 14x + 12 = 2(x^2 + 7x + 6) = 2(x+6)(x+1)$$

$$B(x) = 2x^2 - 2 = 2(x^2 - 1) = 2(x+1)(x-1)$$

$$b. \frac{A(x)}{B(x)} = \frac{2(x+6)(x+1)}{2(x+1)(x-1)} = \frac{(x+6)}{(x-1)}$$

και πρέπει ο

παρονομαστής να είναι $B(x) \neq 0 \Leftrightarrow 2(x+1)(x-1) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq 1 \end{cases}$

$$\frac{B(x)}{A(x)} = \frac{2(x+1)(x-1)}{2(x+6)(x+1)} = \frac{x-1}{x+6} \quad \text{πρέπει ο παρονομαστής να είναι}$$

$$2(x+6)(x+1) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -6 \\ x \neq -1 \end{cases}$$

$$8. \frac{B(x)}{A(x)} + \frac{8x-6}{x^2-36} = 0 \Leftrightarrow \frac{2(x+1)(x-1)}{2(x+6)(x+1)} + \frac{8x-6}{(x+6)(x-6)} = 0 \quad \text{όπου}$$

πρέπει $x \neq \pm 6, x \neq -1$, οπότε έχουμε:


$$\frac{2(x+1)(x-1)}{2(x+6)(x+1)} + \frac{8x-6}{(x+6)(x-6)} = 0 \Leftrightarrow \frac{x-1}{x+6} + \frac{8x-6}{(x+6)(x-6)} = 0 \Leftrightarrow$$

$$(x-1)(x-6) + 8x-6 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 6 + 8x - 6 = 0 \Leftrightarrow$$

$$x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(x+1) = 0 \quad \text{άρα } x=0 \text{ ή } x=-1 \text{ όμως αποκλείουμε το}$$

$x=-1$, άρα η μόνη δέκτη τιμή είναι το $x=0$.

ΑΣΚΗΣΗ 3.



α). Αφού $AM = AN$, και $AB = AG$

θα έχουμε και $MB = NG$. Άρα

στα τρίγωνα MBH και NGK

έχουμε $MB = NG$, $\hat{B} = \hat{G}$ (ως ισόσκελη),

$\angle M\hat{H}B = \angle N\hat{K}G = 90^\circ$ (αφού τα H και K είναι
πόδεςς στην $B\Gamma$), και επομένως θα είναι

και $\angle BMH = \angle GKN$, άρα έχουμε $\Gamma\text{-}\Pi\text{-}\Gamma$

και συνεπώς $MH = KN$.

β. Αφού BMH και NGK είναι όμοια τρίγωνα και $MH = KN$ και

$MH \parallel KN$ (διότι $MH \perp B\Gamma$ και $KN \perp B\Gamma$) το $MNKH$ είναι παραλληλόγραμμο

άρα $MN \parallel B\Gamma$. Αφού $MA \parallel NG$, θα έχουμε $\angle AMN = \angle AB\Gamma = \angle ANM = \angle AGB$

και η $\hat{A}$ είναι κοινή, επομένως αφού έχουν όλες τις γωνίες τους ίσες,
τα τρίγωνα θα είναι όμοια.

γ. Θα είναι $\frac{B\Gamma}{MN} = \frac{AB}{AM} \Leftrightarrow B\Gamma = \frac{12 \cdot 2}{3} = 8$

και $\frac{BH}{\frac{B\Gamma}{2}} = \frac{BM}{AB} \Leftrightarrow BH = \frac{9 \cdot 4}{12} = 3$ ή $BH = B\Gamma - HK - KG \Leftrightarrow$

$BH = B\Gamma - HK - BH \Leftrightarrow$

$2BH = B\Gamma - HK \Leftrightarrow$

$2BH = 8 - 2 \Leftrightarrow$

$BH = 3$



Επαιτέλω Τέλος!!!